高雄市樹德家商 113 學年度高三(301~318)數學科暑假作業

第一冊公式

1-1數線與絕對值：

1. 絕對值定義，若a為實數，則 $|a|=\begin{cases} a & , \ a\ge 0 \\ -a & , \ a<0 \end{cases}$

2. 絕對值不等式：設 $a\ge 0$，

   若 $|x|\le a$，則 $-a\le x\le a$

   若 $|x|\ge a$，則 $x\le -a$ 或 $x\ge a$

3. 一元二次不等式

   (1) 解不等式過程中，若同乘、除一個負數，則不等號要變方向。

   (2) 若方程式 $ax^2+bx+c=0\ (a>0)$有相異實根 α , β，且 $\alpha<\beta$

   (i) 若 $ax^2+bx+c>0$ 或 (≥ 0)，則解為 $x<\alpha$ 或 $x>\beta$ ($x\le\alpha$ 或 $x\ge\beta$)。

   (ii) 若 $ax^2+bx+c<0$ 或 (≤ 0)，則解為 $\alpha<x<\beta$ ($\alpha\le x\le\beta$)

1-2 平面坐標系：

1. 兩點距離公式：

   平面上任意兩點 $A(x_1,y_1)$ 、 $B(x_2,y_2)$，則A點與B點間的距離為 $\overline{AB}=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$ 。

2. 分點公式：

   設平面上任意兩點 $A(x_1,y_1)$ 、 $B(x_2,y_2)$，且P為線段 $\overline{AB}$ 上一點，使得 $\overline{AP}:\overline{BP}=m:n$，

   則P點坐標為 ($\dfrac{n\times x_1+m\times x_2}{m+n}$, $\dfrac{n\times y_1+m\times y_2}{m+n}$)。

3. 中點公式：

   設平面上任意兩點$A(x_1,y_1)$ 、 $B(x_2,y_2)$，且M 為線段$\overline{AB}$的中點，則M 點坐標為 ($\dfrac{x_1+x_2}{2}$, $\dfrac{y_1+y_2}{2}$)。

4. 重心公式：

   ΔABC三頂點$A(x_1,y_1)$ 、 $B(x_2,y_2)$ 、 $C(x_3,y_3)$，且G為ΔABC之重心，

   則G點坐標為 ($\dfrac{x_1+x_2+x_3}{3}$, $\dfrac{y_1+y_2+y_3}{3}$)。

5. 平行四邊形之第四點：

   已知$A(x_1,y_1)$ 、 $B(x_2,y_2)$ 、 $C(x_3,y_3)$， $D(x,y)$，若▱$ABCD$之為平行四邊形，則

   第四點 $D(x,y)=(x_1+x_3-x_2,y_1+y_3-y_2)$

1-3 線型函數與二次函數：

1. 對於每一個x值，剛好有一個而且只能有一個y值與之對應，稱這種對應為「y是x的函數」

2. 線性函數：$y=ax+b$的圖形為一直線。

3. 二次函數：$y=ax^2+bx+c$的圖形為拋物線，經配方法得

   $y=a(x+\dfrac{b}{2a})^2-\dfrac{b^2-4ac}{4a}$，其頂點坐標為 ($-\dfrac{b}{2a}$, $-\dfrac{b^2-4ac}{4a}$)

   (1) $a>0$ 時，拋物線開口向上。　　(2) $a<0$ 時，拋物線開口向下。

2-1 直線斜率：

1. 直線斜率:已知一直線上任意相異二點 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，則此直線斜率 $m=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$ 或 $\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ $(x_1\neq x_2)$。
2. 相異兩直線 L_1、L_2 之斜率分別為 m_1 、 m_2 ，則
   (1) 若 $L_1//L_2$ ，則 $m_1=m_2$ 。
   (2) 若 $L_1\perp L_2$ ，則 $m_1\times m_2=-1$ 。

2-2 直線方程式的求法：

1. 點斜式：直線過點 (x_0,y_0) 且斜率為 m ，則直線方程式為 $y-y_0=m(x-x_0)$ 。
2. 斜截式：直線斜率為 m ， y 截距為 b ，則直線方程式為 $y=mx+b$ 。
3. 截距式：直線 x 截距為 a ， y 截距為 b ，且 $a\times b\neq 0$ ，則直線方程式為 $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=1$ 。
4. 二平行線與二垂直線 ：
   設直線 $L: ax+by+c=0$ ，則與直線 L
   (1) **平行**之直線 L_1 可用 $ax+by+k=0$ 的型式表示。
   (2) **垂直**之直線 L_2 可用 $bx-ay+k=0$ 的型式表示。

2-3 點到直線的距離：

1. 點到直線的距離
   點 $A(x_0,y_0)$ 到直線 $L: ax+by+c=0$ 的距離為 $\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$
2. 兩平行線間的距離
   兩平行線 $L_1: ax+by+c_1=0$ 與 $L_2: ax+by+c_2=0$ 之間的距離為 $\dfrac{|c_1-c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

3-1 多項式的四則運算：

1. 多項式 ：
   (1) 多項式 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ ，
   當 $a_n\neq 0$ 時： $\deg f(x)=n$ ，領導係數為 a_n 。
   (2) 常數多項式 a_0 ： $\begin{cases}\text{零次多項式} & (a_0\neq 0)\\ \text{零多項式} & (a_0=0)\end{cases}$ 。
2. 兩多項式相等 ：(1) 其次數相等 (2) 相同次數項的係數相等
3. 多項式加、減 ：從兩多項式之最高次項開始，依序將次數相同項的係數相加(減)。
4. 多項式乘法 ：
   (1) 逐項展開後，同次項係數相加(減)
   (2) 兩多項式皆不為零多項式， $\deg\left[f(x)\times g(x)\right]=\deg f(x)+\deg g(x)$
5. 多項式除法原理
   設 $f(x)$、$g(x)$ 為二多項式，且 $g(x)\neq 0$，則恰存在二多項式 $q(x)$ 及 $r(x)$ 滿足 $f(x)=g(x)\times q(x)+r(x)$ ，
   其中 $r(x)=0$ 或 $\deg r(x)<\deg g(x)$ 。

3-2 餘式、因式定理：

1. 餘式定理：設 $a\neq 0$，以 $ax-b$ 除 $f(x)$ 所得餘式為 $f(\frac{b}{a})$。

2. 因式定理：設 $a\neq 0$，若 $ax-b$ 為 $f(x)$ 之因式，則 $f(\frac{b}{a})=0$。

3. 一次因式檢驗法：

   設 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ 為一個整係數 n 次多項式，若整係數一次式 $ax-b$ 為 $f(x)$ 的因式，且 a、b 互質，則 a 為 a_n 的因數且 b 為 a_0 的因數。

3-3 分式：

1. 分式 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 可分為三類：

   (1) 真分式：$\deg f(x)<\deg g(x)$

   (2) 假分式：$\deg f(x)\geq \deg g(x)$

   (3) 帶分式：一多項式與真分式相加減

2. 分式之四則運算：

   (1) $\frac{B}{A}\pm\frac{C}{A}=\frac{B\pm C}{A}$，$(A\neq 0)$

   $\frac{C}{A}\pm\frac{D}{B}=\frac{B\times C\pm A\times D}{A\times B}$，$(A\times B\neq 0)$

   (2) $\frac{B}{A}\times\frac{D}{C}=\frac{B\times D}{A\times C}$，$(A\times C\neq 0)$

   (3) $\frac{B}{A}\div\frac{D}{C}=\frac{B\times C}{A\times D}$，$(A\times C\times D\neq 0)$

第二冊公式

1-1 有向角及其度量：

1. 同界角：兩角θ_1與θ_2有相同的始邊與終邊，稱兩角為同界角。即 $\theta_1-\theta_2=360^0\times n=2\pi\times n$ ，n為整數。
2. 扇形的弧長與面積：
3. 設一扇型半徑為 r，圓心角為 θ **弧度**，弧長為 S，面積為 A，則
   (1) $S=r\times\theta$
   (2) $A=\frac{1}{2}\times r^2\times\theta=\frac{1}{2}\times r\times S$

1-2 三角函數的定義與基本性質

1. 銳角三角函數定義：
   ① $\sin\theta=\frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}}$　② $\cos\theta=\frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}}$　③ $\tan\theta=\frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}}$
2. 餘角關係：$\sin(90^0-\theta)=\cos\theta$ ；$\cos(90^0-\theta)=\sin\theta$
3. 商數關係：$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$
4. 平方關係：$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$

1-3 任意角的三角函數



1. 廣義角的三角函數定義：$r=\sqrt{x^2+y^2}>0$
   ① $\sin\theta=\frac{y}{r}$　② $\cos\theta=\frac{x}{r}$　③ $\tan\theta=\frac{y}{x}$ $(x\neq 0)$
2. 各象限內三角函數值之正、負判別：

	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$
第一象限	+	+	+
第二象限	+	−	−
第三象限	−	−	+
第四象限	−	+	−

1-4 三角函數的圖形

三角函數之定義域、值域與週期：

函數	定義域(n為整數)	值域	週期
$\sin x$	x為所有實數	$-1\leq\sin x\leq 1$	2π
$\cos x$	x為所有實數	$-1\leq\cos x\leq 1$	2π
$\tan x$	$x\neq n\pi+\frac{\pi}{2}$ 之所有實數	所有實數	π

1-5 正弦與餘弦定理

1. 正弦定理：

(1) $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R$ 。 (2) $\sin A:\sin B:\sin C=a:b:c$ 。

2. 餘弦定理：

(1) $a^2=b^2+c^2-2\times b\times c\times\cos A$ ； $b^2=a^2+c^2-2\times a\times c\times\cos B$ ； $c^2=a^2+b^2-2\times a\times b\times\cos C$ 。

(2) $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2\times b\times c}$ ； $\cos B=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2\times a\times c}$ ； $\cos C=\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2\times a\times b}$ 。

2-1 向量的意義

1. 設 $A(x_1,y_1)$ 、 $B(x_2,y_2)$ ，則 $\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,y_2-y_1)$ 且 $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$

2. 單位向量：長度為 1 的向量。

已知非零向量 $\overrightarrow{a}$ 的單位向量為 $\pm\dfrac{\overrightarrow{a}}{|\overrightarrow{a}|}$

2-2 向量的加減與實數積

1. 設 $\overrightarrow{a}=(x_1,y_1)$ 、 $\overrightarrow{b}=(x_2,y_2)$ 且 r 為實數，

(1) $\overrightarrow{a}\pm\overrightarrow{b}=(x_1\pm x_2,y_1\pm y_2)$ 。

(2) $r\overrightarrow{a}=(rx_1,rx_2)$

2-3 向量的夾角與內積

1. 設 $\overrightarrow{a}=(x_1,y_1)$ 、 $\overrightarrow{b}=(x_2,y_2)$ 且 $\overrightarrow{a}$ 與 $\overrightarrow{b}$ 的夾角 θ，則內積 $\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}=|\overrightarrow{a}|\times|\overrightarrow{b}|\times\cos\theta=x_1\times x_2+y_1\times y_2$

2. 設兩非零向量 $\overrightarrow{a}=(x_1,y_1)$ ， $\overrightarrow{b}=(x_2,y_2)$ ，

(1) 若 $\overrightarrow{a}\perp\overrightarrow{b}$ ，則 $\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}=0$ 即 $x_1\times x_2+y_1\times y_2=0$ 。

(2) 若 $\overrightarrow{a}//\overrightarrow{b}$ ，則 $\overrightarrow{a}=r\overrightarrow{b}$ 即 $\dfrac{x_1}{x_2}=\dfrac{y_1}{y_2}$ ， $x_2\neq 0$ 且 $y_2\neq 0$ 。

3. $\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{a}=|\overrightarrow{a}|^2\geq 0$

3-1 圓的方程式

1. 圓的標準式：$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$ ，圓心 (h,k) ，半徑 r 。

2. 圓的一般式：$x^2+y^2+dx+ey+f=0$ ，圓心 $\left(-\dfrac{d}{2},-\dfrac{e}{2}\right)$ ，半徑 $r=\dfrac{1}{2}\sqrt{d^2+e^2-4f}$ 。

3. 圓的直徑式：$(x-x_1)\times(x-x_2)+(y-y_1)\times(y-y_2)=0$ ，其中 (x_1,y_1) 、 (x_2,y_2) 為直徑兩端點。

4. 判別 $x^2+y^2+dx+ey+f=0$ 之圖形：

(1) $d^2+e^2-4f>0$ ， 表一圓。

(2) $d^2+e^2-4f=0$ ， 表一點。

(3) $d^2+e^2-4f<0$ ， 表無圖形。

3-2 圓與直線的關係

1. 設 $P(x_0, y_0)$ 與圓 $x^2+y^2+dx+ey+f=0$，則
   (1) P 在圓上 $\Leftrightarrow$ ${x_0}^2+{y_0}^2+dx_0+ey_0+f=0$。
   (2) P 在圓外 $\Leftrightarrow$ ${x_0}^2+{y_0}^2+dx_0+ey_0+f>0$。
   (3) P 在圓內 $\Leftrightarrow$ ${x_0}^2+{y_0}^2+dx_0+ey_0+f<0$。
2. 圓：$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$，直線 $L: ax+by+c=0$，設 d 為圓心到 L 的距離，則
   (1) $d>r$：相離（無交點）。
   (2) $d=r$：相切（交一點）。
   (3) $d<r$：相割（交兩點）。
3. 圓的切線方程式：已知切點 $P(x_0, y_0)$
   (1)標準式：切線方程式為 $(x_0-h)\times(x-h)+(y_0-k)\times(y-k)=r^2$。
   (2)一般式：切線方程式為 $x_0x+y_0y+d(\frac{x+x_0}{2})+e(\frac{y+y_0}{2})+f=0$。
4. 切線段長：圓外一點 $P(x_0, y_0)$
   (1)標準式：切線段長 $l=\sqrt{(x_0-h)^2+(y_0-k)^2-r^2}$。
   (2)一般式：切線段長 $l=\sqrt{{x_0}^2+{y_0}^2+dx_0+ey_0+f}$。

4-1 等差數列與等差級數

1. $a_n=a_1+(n-1)\times d$
2. 等差中項：A、B、C 成等差數列，則稱 B 為 A、C 之等差中項，且 $B=\frac{A+C}{2}$。
3. 等差級數求前 n 項的和：$S_n=\frac{n\times(a_1+a_2)}{2}=\frac{n\times[2\times a_1+(n-1)\times d]}{2}$

4-2 等比數列與等比級數

1. $a_n=a_1\times r^{n-1}$。
2. 等比中項：A、B、C 成等比數列，則稱 B 為 A、C 之等比中項，且 $B=\pm\sqrt{A\times C}$。
3. 等比級數求前 n 項的和：
   (1) $r=1$，$S_n=n\times a_1$
   (2) $r\neq 1$，$S_n=\frac{a_1\times(1-r^n)}{1-r}=\frac{a_1\times(r^n-1)}{r-1}$。

第三冊公式

1-1 一元一次方程式：

一元一次方程式 $ax+b=0$，且 a、b 為實數，則

(1) 當 $a\neq 0$ 時，恰有一解 $x=\dfrac{-b}{a}$

(2) 當 $a=b=0$ 時，⇨ x為無限多解

(3) 當 $a=0$ 且 $b\neq 0$ 時，x為無解

1-2 一元二次方程式：

1. 設 a、b、c為實數且 $a\neq 0$，則 $ax^2+bx+c=0$ 的公式解為 $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ 。

2. 根的性質:

一元二次方程式 $ax^2+bx+c=0$，$a\neq 0$：

(1) $b^2-4ac>0$，x 有二相異實根。

(2) $b^2-4ac=0$，x 有二相等實根。

(3) $b^2-4ac<0$，x 無實根。

(4) 若 α、β 為其二根，則 $\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}$，$\alpha\times\beta=+\dfrac{c}{a}$ 。

3. 已知 α、β 為一元二次方程式的二根，則此方程式為 $x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\times\beta=0$ 。

1-3 二元一次聯立方程組：

1. 對二元一次方程組$\begin{cases}a_1x+b_1y=c_1\\a_2x+b_2y=c_2\end{cases}$，設$L_1$為直線 $a_1x+b_1y=c_1$，L_2為直線 $a_2x+b_2y=c_2$

$\dfrac{a_1}{a_2}\neq\dfrac{b_1}{b_2}$	(x,y) 恰有一組解	相容方程組 L_1與L_2相交於一點
$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$	(x,y) 無限多組解	相依方程組 L_1與L_2重合為一直線
$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}\neq\dfrac{c_1}{c_2}$	(x,y) 無解	矛盾方程組 L_1與L_2互相平行

2-1 一元二次不等式

1. 一元二次不等式的解: **解不等式過程中，若同乘、除一個負數，則不等號要變方向。**

設 a、b、c 為實數且 $a>0$

(1) $b^2-4ac>0$

設 α、β 為 $ax^2+bx+c=0$ 之二根，且 $\alpha<\beta$，則

(1) $ax^2+bx+c>0$ 之解 ⇨ $x<\alpha$ 或 $x>\beta$

(2) $ax^2+bx+c\geq 0$ 之解 ⇨ $x\leq\alpha$ 或 $x\geq\beta$

(3) $ax^2+bx+c<0$ 之解 ⇨ $\alpha<x<\beta$

(4) $ax^2+bx+c\leq 0$ 之解 ⇨ $\alpha\leq x\leq\beta$

(2) $b^2-4ac=0$

設 $ax^2+bx+c=a(x-\alpha)^2$，則

(1) $ax^2+bx+c>0$ 之解 ⇨ x 為不等於 α 的所有實數

(2) $ax^2+bx+c\geq 0$ 之解 ⇨ x 為無限多解

(3) $ax^2+bx+c<0$ 之解 ⇨ 無解

(4) $ax^2+bx+c\leq 0$ 之解 ⇨ $x=\alpha$

(3) $b^2-4ac<0$

(1) $ax^2+bx+c>0$ 之解 ⇨ x 為無限多解

(2) $ax^2+bx+c\geq 0$ 之解 ⇨ x 為無限多解

(3) $ax^2+bx+c<0$ 之解 ⇨ 無解

(4) $ax^2+bx+c\leq 0$ 之解 ⇨ 無解

2-2 二元一次不等式的圖形

1. 設直線 $L:ax+by+c=0$，若 $a>0$，則二元一次不等式

(1) $ax+by+c>0$ 的圖形為直線 L 的右半平面，不含直線 L (畫虛線) 。$ax+by+c\leq 0$

(2) $ax+by+c\geq 0$ 的圖形為直線 L 的右半平面，含直線 L (畫實線) 。

(3) $ax+by+c<0$ 的圖形為直線 L 的左半平面，不含直線 L (畫虛線) 。

(4) $ax+by+c\leq 0$ 的圖形為直線 L 的左半平面，含直線 L (畫實線)。

2. 設直線 $L:ax+by+c=0$，且平面任意兩點 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$，則

(1) P,Q 在 L 之同側 $\Leftrightarrow$ $(ax_1+by_1+c)\times(ax_2+by_2+c)>0$

(2) P,Q 在 L 之異側 $\Leftrightarrow$ $(ax_1+by_1+c)\times(ax_2+by_2+c)<0$。

(3) P 或 Q 有一點在 L 上 $\Leftrightarrow$ $(ax_1+by_1+c)\times(ax_2+by_2+c)=0$。

2-3 線性規劃

1. 線性規劃解法：

(1)依題意列出不等式及目標函數 $f(x,y)$。

(2)繪出不等式圖形之區域，並求各頂點坐標。

(3)目標函數的最大、最小值必發生在區域的頂點中，將每一頂點代入目標函數 $f(x,y)$ 中，即可求出最大值或最小值。

3-1 指數與對數及其運算的意義

1. 指數律： $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ； $(a^m)^n = a^{m\times n}$； $a^n \times b^n = (a\times b)^n$； $a^0 = 1$ ； $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$ ； $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ ； $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

2. 對數的性質：a 、b 、c 皆大於 0 不等於 1，d 、M 、N 皆大於 0

(1) $\log_a 1 = 0$ (2) $\log_a M + \log_a N = \log_a (M\times N)$ (3) $\log_a M - \log_a N = \log_a (\dfrac{M}{N})$

(4) $\log_{a^s} M^r = \dfrac{r}{s}\times \log_a M$ (5) $\log_a M = \dfrac{\log_b M}{\log_b a}$ (6) $\log_a b \times \log_b c \times \log_c d = \log_a d$ (7) $a^{\log_a M} = M$ 。

3-2 指數圖形

1. $y = a^x$ 恆過 (0 , 1) 且 恆正。

2. 當 $a>1$ 時，$y = a^x$ 為增函數；當 $a<1$ 時，$y = a^x$ 為減函數。

3-3 對數圖形

1. $y = \log_a x$ 恆過 (1 , 0)。

2. 當 $a>1$ 時，$y = \log_a x$ 為增函數；當 $0<a<1$ 時，$y = \log_a x$ 為減函數。

3. $y = a^x$ 與 $y = \log_a x$ 的圖形 對稱於直線 $y = x$ 。



$a>1$



$0<a<1$

3-4 常用對數

1. 設 $\log x = n + a$ ，其中 n 為整數且 $0 \le a < 1$ ，則 n 稱為首數，a 為尾數。

2. 當真數大於 1 時，則真數為 $(n+1)$ 位數。

3. 當真數介於 0~1 之間時，則真數為小數點後第 $|n|$ 位始不為 0 的數。

第四冊公式

1-1 乘法原理與樹狀圖：

1. 加法原理：設完成某件事情有 $A_1, A_2, \cdots, A_m$ 等 m 種不同方式，

   而每一方式 A_i 皆有 n_i 個方法 $(i=1,2,\cdots,m)$

   則完成該件事情共有 $n_1+n_2+\cdots+n_i+\cdots n_m$ 個方法。

2. 乘法原理：設完成某件事情需要經過 k 個步驟，

   而每個步驟分別有 $m_1, m_2, \cdots, m_k$ 種方法，

   則完成該件事的方法總數有 $m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_k$ 種。

1-2 排列與組合：

1. 階乘: $n! = n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times 3\times 2\times 1$。

2. 相異物的直線排列

   由 n 件不同的事物中，任選 m 件（ $m \le n$ ）的排列數為

   $P_m^n = \dfrac{n!}{(n-m)!} = n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times(n-m+1)$。

   《註》(1) $P_n^n = n! = n\times(n-1)\times\cdots\times 2\times 1$

   (2) $P_m^n = n\times P_{m-1}^{n-1} = (n-m+1)\times P_{m-1}^n$

3. 不盡相異物的直線排列

   (1) 設 n 件事物中有 m 件相同（ $m \le n$ ），其餘均不同，則此 n 件事物全取排列的排列數為 $\dfrac{n!}{m!}$。

   (2) 設 n 件事物中，共有 k 類，第一類有 m_1 件，第二類有 m_2 件，...，第 k 類有 m_k 件（此時 $n = m_1+m_2+\cdots+m_k$ ），則此 n 件事物全取排成一列的排列數為 $\dfrac{n!}{m_1!\times m_2!\times\cdots\times m_k!}$。

4. 組合公式：

   (1) $C_m^n = C_{n-m}^n$

   (2) $C_m^n = C_m^{n-1} + C_{m-1}^{n-1}$

   (3) $C_0^n + C_1^n + C_2^n + \cdots + C_n^n = 2^n$

5. 重複排列:

   自 n 件相異物中，任選 m 個的重複排列總數為 n^m。

6. **組合**

   自 n 件相異的事物中，任選 m 件（ $0 \le m \le n$ ）為一組的組合數為

   $C_m^n = \dfrac{P_m^n}{m!} = \dfrac{n!}{m!(n-m)!} = \dfrac{n\times(n-1)\times\cdots\times(n-m+1)}{m\times(m-1)\times\cdots\times 2\times 1}$。

   《註》(1) $C_n^n = 1$；$C_0^n = 1$

   (2) $C_m^n \times m! = P_m^n$

1-3 二項式定理：

1. 對於任意正整數 n

$$(x+y)^n=\sum_{r=0}^{n}C_r^n x^{n-r}y^r=C_0^n x^n+C_1^n x^{n-1}y+C_2^n x^{n-2}y^2+\cdots+C_r^n x^{n-r}y^r+\cdots+C_n^n y^n$$

《註》$(x+y)^n$展開式中，依x的降冪排列，第$r+1$項為 $C_r^n x^{n-r}y^r$ ，又稱為一般項。

2.

(1) $C_m^n=C_{n-m}^n$ （ $0\le m\le n$ ）

(2) $C_m^n=C_m^{n-1}+C_{m-1}^{n-1}$ （ $1\le m\le n-1$ ）

(3) $C_0^n+C_1^n+C_2^n+\cdots+C_n^n=2^n$

《註》a 、b為不大於n的自然數，則$C_a^n=C_b^n$ $\Leftrightarrow$ $a=b$ 或 $a+b=n$ 。

2-1 樣本空間與事件

1. $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$ 。
2. $n(A-B)=n(A)-n(A\cap B)$ 。
3. 笛摩根法則：

(1) $(A\cup B)'=A'\cap B'$ ； (2) $(A\cap B)'=A'\cup B'$ 。

2-2 求機率問題

1. 設S為樣本空間，其中各基本事件出現機會均等，若$A\subset S$為一事件，則事件A發生機率記為$P(A)=\dfrac{n(A)}{n(S)}$ 。
2. 機率性質：

(1) $P(\varnothing)=0$ ； (2) $P(S)=1$ ； (3) $0\le P(A)\le 1$ ； (4) $P(A')=1-P(A)$

3. 條件機率：設A 、B為樣本空間S中的任意二事件，則在A事件發生的情況下，B事件發生的條件機率為

$$P(B|A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{n(A\cap B)}{n(A)}$$ 。

4. 獨立事件：設A 、B為樣本空間S中的任意二個獨立事件，則$P(A\cap B)=P(A)\times P(B)$ 。

2-3 數學期望值

1. 設一隨機試驗的樣本空間為S ，$\{A_1,A_2,\cdots,A_n\}$為樣本空間S的一個分割，且事件A_i發生的機率為p_i （ $i=1$、2、...、n ），若事件A_i發生可得數值m_i（ $i=1$、2、...、n ）的報酬，則$E=p_1\times m_1+p_2\times m_2+\cdots+p_n\times m_n$ 稱為此隨機試驗的數學期望值，簡稱期望值。

2-4 抽樣方法

(1) 簡單隨機抽樣

(2) 系統抽樣

(3) 分層隨機抽樣

(4) 部落抽樣

2-5 資料整理與圖表編製

1. 資料整理的步驟：(1)分類；(2)歸類；(3)列表；(4)繪圖。
2. 編製次數分配表的步驟：
   (1)求全距；(2)求組數；(3)定組距；(4)定組限；(5)歸類劃記；(6)計算次數；
   (7)整理成統計表；(8)作次數直方圖及次數分配曲線圖。
3. 離散型資料的圖表：(1)長條圖；(2)折線圖；(3)圓面積圖。

2-6 算數平均數、加權平均數、中位數、眾數、四分位距

1. 算術平均數： 設一群數值為 x_1、x_2、...、x_n，則其算術平均數 $\overline{X}$ 定義為 $\overline{X}=\dfrac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{n}$ 。
2. 加權平均數：
   設 w_1、w_2、...、w_n 分別為一群數值 x_1、x_2、...、x_n 的權數，
   則這一群數值的加權平均數 W 定義為 $W=\dfrac{w_1x_1+w_2x_2+\cdots+w_nx_n}{w_1+w_2+\cdots+w_n}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}w_ix_i}{\sum_{i=1}^{n}w_i}$ 。
3. 中位數
   將一群數值由小而大排列如下：$x_1\le x_2\le\cdots\le x_n$
   當 $n=2k+1$ 為奇數時：中位數定義為 $Me=x_{k+1}$（排在正中間的數值）
   當 $n=2k$ 為偶數時：中位數定義為 $Me=\dfrac{x_k+x_{k+1}}{2}$（排在正中間兩個數值的算術平均）
4. 眾數
   一群數值資料中，出現次數最多的數值稱為眾數，通常用 Mo 來表示。
5. 四分位距
   設一群數值由小而大排列如下：$x_1\le x_2\le\cdots\le x_n$，其中 $n=2k$ 或 $2k+1$，則
   第 1 四分位數 Q_1 為 x_1、...、x_k 的中位數
   第 3 四分位數 Q_3 為 x_{n-k+1}、...、x_n 的中位數
   而 Q_3 與 Q_1 的差稱為四分位距，以 IQR 來表示，亦即 $IQR=Q_3-Q_1$。

2-6 標準差

1. 樣本的變異數與標準差：
   設一組樣本資料為 x_1、x_2、...、x_n，其算術平均數為 $\overline{X}$，
   則樣本的變異數為 $S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline{X}\right)^2$，其中 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$ 。
   而樣本的標準差為 $S=\sqrt{\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline{X}\right)^2}=\sqrt{\dfrac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\overline{X}^2\right)}$ 。

2. 母群體的變異數與標準差：

設母群體資料為 x_1、x_2、...、x_N，其算術平均數為 μ，則母群體的變異數為 $\sigma^2=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\mu)^2$，其中 $\mu=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}x_i$。

而母群體的標準差為 $\sigma=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\mu)^2}=\sqrt{\frac{1}{N}\left(\sum_{i=1}^{N}x_i^2\right)-\mu^2}$ 。

2-7 解讀信賴區間與信心水準

1. 常態分配（68-95-99.7 規則）



(1)介於 $\overline{X}-S$ 與 $\overline{X}+S$ 之間，約有 68% 個資料。

(2)介於 $\overline{X}-2S$ 與 $\overline{X}+2S$ 之間，約有 95% 個資料。

(3)介於 $\overline{X}-3S$ 與 $\overline{X}+3S$ 之間，約有 99.7% 個資料。

2. 信賴區間

是用來評估調查的不確定性的指標，它是由抽樣的樣本所計算出來，用以推估有多少的信心說明母群體的平均數或百分比在此區間內，通常是用 95% 的信賴區間來表示。

3. 95%的信心水準

不斷地重複抽取隨機樣本，隨著樣本不同，信賴區間也會隨樣本而改變，在眾多的區間當中，約有 95% 的區間會涵蓋真正的母群體平均數或百分比。